

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Лиховид Андрей Александрович

Должность: И.о. декана медико-биологического факультета

Дата подписания: 19.06.2026 15:02:48

Уникальный программный ключ:

842008d9d07ceade57ed427a05fd21c9bdc6cab6

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Декан медико-биологического факультета

д-р геогр.наук проф. Лиховид А.А.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Оказание помощи в аптечных учреждениях»

Специальность	<u>33.05.01 Фармация</u>
Год начала обучения	<u>2026</u>
Форма обучения	<u>очная</u>
Реализуется в семестре	4

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточного аттестации по дисциплине «Оказание помощи в аптечных учреждениях» у студентов, обучающихся по специальности 33.05.01 Фармация очной формы обучения.
2. ФОС является приложением к программе дисциплины (модуля) «Оказание помощи в аптечных учреждениях»
3. Разработчик (и) Глижова Т.Н. доцент кафедры фармацевтики и фармакогнозии
4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель комиссии: Пахомова Т.А., председатель УМК МБФ

Члены экспертной группы:

Аненько Д.С., доцент кафедры фармацевтики и фармакогнозии

Арутюнова Н.В. доцент кафедры фармацевтики и фармакогнозии

Представитель организации-работодателя Кузякова Л.М., директор НПК «Пульс» фармацевтики и фармакогнозии

Экспертное заключение: рекомендуется к использованию в учебном процессе

«_____»_____

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Индикаторы	Уровни сформированности компетенции(ий), индикатора (ов)			
	Минимальный уровень достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор: ИД-4</i> УК-7 выбирает здоровьесберегающие технологии для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности с учетом физиологических особенностей организма и условий жизнедеятельности	Не применяет знания основы физической культуры и спорта	Применяет знания основы физической культуры, выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической подготовленности с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации социальной и профессиональной деятельности на минимальном уровне	Применяет знания основы физической культуры, выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической подготовленности с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации социальной и профессиональной деятельности на среднем уровне, использует их в профессиональной деятельности	Демонстрирует знание здоровьесберегающих технологий и физиологических особенностей организма для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-5 УК-7 планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности в профессиональной деятельности;	Не планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности в профессиональной деятельности	Применяет в отдельных случаях планирование своего рабочего и свободного времени для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности в профессиональной деятельности	Применяет планирование своего рабочего и свободного времени для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности на среднем уровне, использует его в профессиональной деятельности	Рационально сочетает физическую и умственную нагрузку и обеспечивает работоспособность в профессиональной деятельности

ИД-6 УК-7 поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни.	Не соблюдает и не пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиона льной деятельности	Применяет в отдельных случаях основы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности	Применяет основы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональ ной деятельности, пропагандирует его нормы	Демонстрирует знание норм здорового образа жизни и поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ ной
<i>Компетенция: ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на территории фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей до приезда бригады скорой помощи</i>				
ИОПК-5.1. Знает медицинские средства защиты, оказания медицинской помощи.	Теоретически не подготовлен	Владеет небольшим объемом информации по медицинской помощи	Владеет объемом информации по медицинской помощи, но совершает незначительные ошибки	Знает медицинские средства защиты, оказания медицинской помощи.
ИОПК-5.2. Умеет определять факт возникновения неотложного состояния у посетителя организации, при котором необходимо оказание первой помощи	Может устанавливать факт угрозы	Умеет устанавливать факт возникновения неотложного состояния	Умеет устанавливать факт возникновения неотложного состояния у посетителя аптечной организации, но оказывает мед.помощь с ошибками	Умеет устанавливать факт возникновения неотложного состояния у посетителя аптечной организации, при котором необходимо оказание первой помощи

ИОПК-5.3. Владеет навыками проведения мероприятия по оказанию первой помощи до приезда бригады скорой помощи	Не способен организовать мероприятие по оказанию первой помощи	Владеет навыками проведения мероприятий с выбором медикаментозного лечения	Владеет навыками проведения мероприятий по оказанию первой помощи	Владеет навыками проведения мероприятий по оказанию первой помощи до приезда бригады скорой помощи
--	--	--	---	--

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Очная форма обучения, 4 семестр			
1.	Процесс распространения инфекционных болезней среди коллектива людей	Эпидемиологический процесс-это	УК-7
2.	Ревакцинация	Повторная вакцинация носит название:	УК-7
3.	1, 3, 4	Первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение головного мозга: 1. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой 2. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку 3. на голову пострадавшему положить холод 4. вызвать врач	УК-7
4.	Карантин	Как называется система мер, направленных на предупреждение возникновения болезни:	УК-7
5.	Естественный	В результате перенесённого заболевания формируется такой иммунитет:	УК-7
6.	Это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.	Что такое психическое здоровье?	УК-7
7.	1.Бессвязная речь; 2.Ассиметрия лица; 3.Отставание в акте движения в одной из рук.	Триада симптомов при инсульте:	УК-7
8.	Хроническое заболевание головного мозга различной этиологии, проявляющееся, повторными,	Эпилепсия – это...	УК-7

	неспровоцированными эпилептическими припадками, а также приступами нарушений мыслительных, вегетативных и чувствительных функций.		
9.	1, 4	Формами оказания медицинской помощи являются: 1) экстренная; 2) специализированная 3) домашняя 4) неотложная;	УК-7
10.	Внезапное расстройство функций головного мозга, вызванное нарушением его кровоснабжения.	Инсульт – это	УК-7
11.	4,3,1,2,5	Напишите последовательность общего алгоритма действий при возникновении неотложного состояния: 1. По возможности установить словесный контакт с пациентом. 2. Осуществить контроль основных параметров жизнедеятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 3. Визуально оценить общее состояние пациента, кожный покров (цвет, влажность или сухость, наличие сыпи). 4. Осмотреться, обезопасить себя и пострадавшего. 5. Экстренно начинать реанимационные мероприятия.	УК-7
12.	Состояние, когда приступы повторяются, и между ними человек не приходит в состояние ясного сознания.	Что такое эпилептический статус?	УК-7
13.	В большинстве случаев приступы развиваются внезапно, продолжительность их составляет от 5 до 15 минут.	Как чаще всего развиваются приступы эпилепсии?	УК-7
14.	3	К инфекционным заболеваниям относят 1. гепатит А 2. гайморит	УК-7

		3. ветряная оспа 4. аппендицит	
15.	Обычно развивается в течение нескольких часов, сопровождаясь значительным повышением уровня глюкозы крови	Какое развитие заболевания характерно для кетоацидотической комы?	УК-7
16.	сердце	Дифтерия опасна тем, что дает осложнение на этот орган:	УК-7
17.	1, 2, 3, 4	Противопоказанием для вакцинации считают 1. острую лихорадку 2. недавно перенесенную инфекцию 3. наличие хронической инфекции 4. тяжелые пороки сердца	УК-7
18.	1. Нарастающая общая слабость, потемнение в глазах, сонливость, адинамия, головокружение; 2. жажда, сухость во рту; 3. бледность кожи, холодный липкий пот; 4. частое, поверхностное дыхание; 5. прогрессирующее снижение АД, слабый пульс.	Клинические признаки внутреннего кровотечения:	УК-7
19.	2	Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП? 1. Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой. 2. Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой. 3. Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем.	УК-7
20.	.1,2,4	Могут наблюдаться общие явления при кровотечениях: 1. Головокружение 2. Учащение пульса	УК-7

		3. Повышение аппетита 4. Развитие обморока	
21.	2	Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении? 1. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см. 2. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см. 3. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.	УК-7
22.	2	Один из главных признаков наружного кровотечения: 1. кровь темно-красного цвета 2. кровь ярко-красного цвета 3. медленное и тягучее кровотечение	УК-7
23.	3	Необходимо верно указать один из главных признаков внутреннего кровотечения: 1. чувство неутолимого голода 2. повышение артериального давления 3. кашель с кровянистыми выделениями	УК-7
24.	1,2,3,4	Какие существуют ожоги по степени?	УК-7
25.	1	Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего? 1. Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в замок, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота в направлении внутрь и вверх. 2. Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот. 3. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.	УК-7
26.	Как правило, развивается внезапно, чаще при значительных и резких перепадах уровней гликемии (например,	Какое развитие характерно для гипокликемической комы?	УК-7

	быстрое снижение с 18-20 до 7-8 ммоль/л). У лиц, длительно страдающих СД, симптомы гипогликемии могут возникать и при нормальных уровнях глюкозы плазмы крови.		
27.	2	Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 1. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 2. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть 3. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.	УК-7
28.	1-я степень: судорожное сокращение мышц без потери сознания; 2-я степень: судорожное сокращение мышц с потерей сознания; 3-я степень: судорожное сокращение мышц с потерей сознания и нарушением функций сердечно-сосудистой системы; 4-я степень: клиническая смерть.	Опишите степени электротравмы	УК-7
29.	2	Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи? 1. На спину с подложенным под голову валиком. 2. На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой. 3. На спину с вытянутыми ногами.	УК-7
30.	2	Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 1. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего:	УК-7

		вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину. 2. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту». 3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту»	
31.	1, 3	Психическое здоровье включает: 1. эмоциональный статус 2. функциональные резервы физиологических систем 3. интеллектуальные способности 4. ценностно-мотивационные установки	УК-7
32.	3	Первая медицинская помощь при ушибах: 1. наложение тепла на место ушиба 2. наложение на повреждённое место гипс 3. наложение холода на место ушиба	УК-7
33.	3	Каковы основные признаки наружного кровотечения? 1. медленное и тягучее кровотечение 2. быстрое и пульсирующие кровотечение 3. сильная боль в повреждённой части тела 4. кровь ярко-красного цвета 5. кровь темно-красного цвет	УК-7
34.	Это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем	Что такое физическое здоровье?	УК-7
35.	Локализованный остро транзиторный, склонный к рецидивированию, отек кожи или слизистых оболочек.	Что такое ангионевротический отек?	УК-7
36.	Наличие воздуха в плевральной полости.	Пневмоторакс – это...	УК-7
37.	2	При артериальном кровотечении жгут накладывают: 1. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 13-15 см выше раны наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань	УК-7

		2. плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения 3. прижать пальцем артерию ниже кровотечения	
38.	1	Один из главных признаков внутреннего кровотечения: 1. учащённый слабый пульс и частое дыхание 2. чувство неутолимого голода 3. пожелтение кожи в области повреждения	УК-7
39.	2, 3	Здоровый образ жизни подразумевает 1. проживание в благоприятных условиях 2. оптимальную двигательную активность 3. рациональное питание 4. отсутствие заболеваний	УК-7
40.	Угрожающее жизни состояние, обусловленное реакцией организма в ответ на введение лекарственных веществ, а также реакцией на пищевые продукты, укусы насекомых, змей, сопровождающееся резким падением АД.	Что такое анафилактический шок?	УК-7
41.	1	Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой медицинской помощи» при ЧС? 1. Указать точное место совершенного ЧС (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ЧС). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения. 2. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ЧС. Сообщить, кто пострадал в ЧС, и описать полученные травмы. 3. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ЧС. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст.	УК-7
42.	Термические, химические, лучевые, электрические	Как классифицируются ожоги по факторам повреждения?	УК-7
43.	3	Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 1. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и признаков дыхания.	УК-7

		2. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания. 3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.	
44.	3	Один из главных признаков поверхностного венозного кровотечения: 1. слабость 2. кровь фонтанирует из раны 3. кровь спокойно вытекает из раны	УК-7
45.	Вне медицинской организации; амбулаторно; в дневном стационаре; стационарно	Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:	УК-7
46.	3	Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 1. Наложить жгут ниже места ранения 2. Наложить жгут выше места ранения 3. Наложить давящую повязку на место ранения	УК-7
47.	Нарушение скорости сокращений сердца, их регулярности в результате функционального или органического поражения специализированных проводящих миокардиоцитов	Что такое аритмия?	УК-7
48.	1	При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается: 1. С наложения жгута выше раны на месте перелома. 2. С наложения давящей повязки. 3. С наложения импровизированной шины.	УК-7
49.	Медикаменты; алкоголь и суррогаты; прижигающие жидкости; окись углерода; грибы	Напишите основные группы веществ, вызывающие острые отравления:	УК-7
50.	Приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу сердца	Если пострадавший находится без сознания, у него нет пульса на сонной артерии и отсутствует дыхание, то необходимо	УК-7

51.	2	Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи? 1. Разрешено 2. Запрещено 3. Разрешено в случае крайней необходимости.	УК-7
52.	1. Сильные боли за грудиной или в области сердца, сжимающего, давящего, жгучего характера, часто иррадиирующие в левое плечо, в левую руку, в шею, нижнюю челюсть, или под лопатку, не проходящие более 15 минут; 2. Возникновение чувства страха смерти; 3. Холодный липкий пот.	Триада симптомов, позволяющая заподозрить инфаркт миокарда (ангинозная форма):	УК-7
53.	Определяют по амплитуде экскурсии грудной клетки пациента, уменьшению и исчезновению цианоза и по выраженности спонтанных дыхательных движений.	Как определяют эффективность искусственного дыхания?	УК-7
54.	2	В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника? 1. Уложить пострадавшего на бок. 2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела. 3. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.	УК-7
55.	Показатель аэробных возможностей организма	Максимальное потребление кислорода-это:	УК-7
56.	Сформированная в процессе жизни потребность в движении	Кинезофилия-это	УК-7
57.	1	Соматическое здоровье включает: 1. физическое развитие	УК-7

		2. функциональные резервы физиологических систем 3. интеллектуальные способности 4. ценностно-мотивационные установки	
58.	1,2,3,4	Факторами образа жизни, ухудшающими здоровье человека, являются 1. гипердинамия 2. отсутствие рационального режима дня 3. плохие условия быта и производства 4. вредные привычки	УК-7
59.	Совокупность симптомов, требующих оказания первой помощи, неотложной медицинской помощи, либо госпитализации пострадавшего или пациента в целях предотвращения значительного и долгосрочного воздействия на физическое или психическое здоровье человека, оказавшегося в таком состоянии.	Неотложные (критические) состояния - это	УК-7
60.	2	Оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах заключается в том чтобы: 1. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом 2. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом 3. смазать рану вазелином или кремом	УК-7
1.	Процесс распространения инфекционных болезней среди коллектива людей	Эпидемиологический процесс-это	ОПК-5
2.	Ревакцинация	Повторная вакцинация носит название:	ОПК-5
3.	1, 3, 4	Первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение головного мозга: 1. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой 2. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку 3. на голову пострадавшему положить холод	ОПК-5

		4. вызвать врач	
4.	Карантин	Как называется система мер, направленных на предупреждение возникновения болезни:	ОПК-5
5.	Естественный	В результате перенесённого заболевания формируется такой иммунитет:	ОПК-5
6.	Это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.	Что такое психическое здоровье?	ОПК-5
7.	1.Бессвязная речь; 2.Ассиметрия лица; 3.Отставание в акте движения в одной из рук.	Триада симптомов при инсульте:	ОПК-5
8.	Хроническое заболевание головного мозга различной этиологии, проявляющееся, повторными, неспровоцированными эпилептическими припадками, а также приступами нарушений мыслительных, вегетативных и чувствительных функций.	Эпилепсия – это...	ОПК-5
9.	1, 4	Формами оказания медицинской помощи являются: 5) экстренная; 6) специализированная 7) домашняя 8) неотложная;	ОПК-5
10.	Внезапное расстройство функций головного мозга,	Инсульт – это	ОПК-5

	вызванное нарушением его кровоснабжения.		
11.	4,3,1,2,5	Напишите последовательность общего алгоритма действий при возникновении неотложного состояния: 1. По возможности установить словесный контакт с пациентом. 2. Осуществить контроль основных параметров жизнедеятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 3. Визуально оценить общее состояние пациента, кожный покров (цвет, влажность или сухость, наличие сыпи). 4. Осмотреться, обезопасить себя и пострадавшего. 5. Экстренно начинать реанимационные мероприятия.	ОПК-5
12.	Состояние, когда приступы повторяются, и между ними человек не приходит в состояние ясного сознания.	Что такое эпилептический статус?	ОПК-5
13.	В большинстве случаев приступы развиваются внезапно, продолжительность их составляет от 5 до 15 минут.	Как чаще всего развиваются приступы эпилепсии?	ОПК-5
14.	3	К инфекционным заболеваниям относят 1. гепатит А 2. гайморит 3. ветряная оспа 4. аппендицит	ОПК-5
15.	Обычно развивается в течение нескольких часов, сопровождаясь значительным повышением уровня глюкозы крови	Какое развитие заболевания характерно для кетоацидотической комы?	ОПК-5
16.	сердце	Дифтерия опасна тем, что дает осложнение на этот орган:	ОПК-5
17.	1, 2, 3, 4	Противопоказанием для вакцинации считают 1. острую лихорадку 2. недавно перенесенную инфекцию 3. наличие хронической инфекции 4. тяжелые пороки сердца	ОПК-5

18.	1.Нарастающая общая слабость, потемнение в глазах, сонливость, адинамия, головокружение; 2.жажда, сухость во рту; 3.бледность кожи, холодный липкий пот; 4.частое, поверхностное дыхание; 5.прогрессирующее снижение АД, слабый пульс.	Клинические признаки внутреннего кровотечения:	ОПК-5
19.	2	Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП? 4. Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой. 5. Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой. 6. Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем.	ОПК-5
20.	.1,2,4	Могут наблюдаться общие явления при кровотечениях: 5. Головокружение 6. Учащение пульса 7. Повышение аппетита 8. Развитие обморока	ОПК-5
21.	2	Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении? 4. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см. 5. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см. 6. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.	ОПК-5
22.	2	Один из главных признаков наружного кровотечения: 1. кровь темно-красного цвета 2. кровь ярко-красного цвета	ОПК-5

		3. медленное и тягучее кровотоечение	
23.	3	Необходимо верно указать один из главных признаков внутреннего кровотечения: 1. чувство неутолимого голода 2. повышение артериального давления 3. кашель с кровянистыми выделениями	ОПК-5
24.	1,2,3,4	Какие существуют ожоги по степени?	ОПК-5
25.	1	Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего? 4. Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в замок, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху. 5. Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот. 6. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.	ОПК-5
26.	Как правило, развивается внезапно, чаще при значительных и резких перепадах уровней гликемии (например, быстрое снижение с 18-20 до 7-8 ммоль/л). У лиц, длительно страдающих СД, симптомы гипогликемии могут возникать и при нормальных уровнях глюкозы плазмы крови.	Какое развитие характерно для гипокликемической комы?	ОПК-5
27.	2	Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 4. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 5. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю	ОПК-5

		челюсть 6. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.	
28.	1-я степень: судорожное сокращение мышц без потери сознания; 2-я степень: судорожное сокращение мышц с потерей сознания; 3-я степень: судорожное сокращение мышц с потерей сознания и нарушением функций сердечно-сосудистой системы; 4-я степень: клиническая смерть.	Опишите степени электротравмы	ОПК-5
29.	2	Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи? 4. На спину с подложенным под голову валиком. 5. На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой. 6. На спину с вытянутыми ногами.	ОПК-5
30.	2	Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 4. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину. 5. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту». 6. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту»	ОПК-5
31.	1, 3	Психическое здоровье включает: 1. эмоциональный статус 2. функциональные резервы физиологических систем 3. интеллектуальные способности 4. ценностно-мотивационные установки	ОПК-5
32.	3	Первая медицинская помощь при ушибах: 1. наложение тепла на место ушиба 2. наложение на повреждённое место гипс 3. наложение холода на место ушиба	ОПК-5

33.	3	Каковы основные признаки наружного кровотечения? 1. медленное и тягучее кровотечение 2. быстрое и пульсирующие кровотечение 3. сильная боль в повреждённой части тела 4. кровь ярко-красного цвета 5. кровь темно-красного цвет	ОПК-5
34.	Это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем	Что такое физическое здоровье?	ОПК-5
35.	Локализованный транзиторный остро возникающий, склонный к рецидивированию, отек кожи или слизистых оболочек.	Что такое ангионевротический отек?	ОПК-5
36.	Наличие воздуха в плевральной полости.	Пневмоторакс – это...	ОПК-5
37.	2	При артериальном кровотечении жгут накладываю: 1. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 13-15 см выше раны наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань 2. плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения 3. прижать пальцем артерию ниже кровотечения	ОПК-5
38.	1	Один из главных признаков внутреннего кровотечения: 1. учащённый слабый пульс и частое дыхание 2. чувство неутолимого голода 3. пожелтение кожи в области повреждения	ОПК-5
39.	2, 3	Здоровый образ жизни подразумевает 1. проживание в благоприятных условиях 2. оптимальную двигательную активность 3. рациональное питание 4. отсутствие заболеваний	ОПК-5

40.	Угрожающее жизни состояние, обусловленное реакцией организма в ответ на введение лекарственных веществ, а также реакцией на пищевые продукты, укусы насекомых, змей, сопровождающееся резким падением АД.	Что такое анафилактический шок?	ОПК-5
41.	1	Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой медицинской помощи» при ЧС? 4. Указать точное место совершенного ЧС (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ЧС). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения. 5. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ЧС. Сообщить, кто пострадал в ЧС, и описать полученные травмы. 6. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ЧС. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст.	ОПК-5
42.	Термические, химические, лучевые, электрические	Как классифицируются ожоги по факторам повреждения?	ОПК-5
43.	3	Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 4. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии и признаков дыхания. 5. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания. 6. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания.	ОПК-5
44.	3	Один из главных признаков поверхностного венозного кровотечения: 1. слабость 2. кровь фонтанирует из раны 3. кровь спокойно вытекает из раны	ОПК-5
45.	Вне медицинской организации; амбулаторно; в дневном стационаре; стационарно	Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:	ОПК-5
46.	3	Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 4. Наложить жгут ниже места ранения	ОПК-5

		5. Наложить жгут выше места ранения 6. Наложить давящую повязку на место ранения	
47.	Нарушение скорости сокращений сердца, их регулярности в результате функционального или органического поражения специализированных проводящих миокардиоцитов	Что такое аритмия?	ОПК-5
48.	1	При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается: 4. С наложения жгута выше раны на месте перелома. 5. С наложения давящей повязки. 6. С наложения импровизированной шины.	ОПК-5
49.	Медикаменты; алкоголь и суррогаты; прижигающие жидкости; окись углерода; грибы	Напишите основные группы веществ, вызывающие острые отравления:	ОПК-5
50.	Приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу сердца	Если пострадавший находится без сознания, у него нет пульса на сонной артерии и отсутствует дыхание, то необходимо	ОПК-5
51.	2	Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи? 4. Разрешено 5. Запрещено 6. Разрешено в случае крайней необходимости.	ОПК-5
52.	1. Сильные боли за грудиной или в области сердца, сжимающего, давящего, жгучего характера, часто иррадиирующие в левое плечо, в левую руку, в шею, нижнюю челюсть, или под лопатку, не проходящие более 15	Триада симптомов, позволяющая заподозрить инфаркт миокарда (ангинозная форма):	ОПК-5

	минут; 2. Возникновение чувства страха смерти; 3. Холодный липкий пот.		
53.	Определяют по амплитуде экскурии грудной клетки пациента, уменьшению и исчезновению цианоза и по выраженности спонтанных дыхательных движений.	Как определяют эффективность искусственного дыхания?	ОПК-5
54.	2	В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника? 4. Уложить пострадавшего на бок. 5. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела. 6. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.	ОПК-5
55.	Показатель аэробных возможностей организма	Максимальное потребление кислорода-это:	ОПК-5
56.	Сформированная в процессе жизни потребность в движении	Кинезофилия-это	ОПК-5
57.	1	Соматическое здоровье включает: 1. физическое развитие 2. функциональные резервы физиологических систем 3. интеллектуальные способности 4. ценностно-мотивационные установки	ОПК-5
58.	1,2,3,4	Факторами образа жизни, ухудшающими здоровье человека, являются 1. гипердинамия 2. отсутствие рационального режима дня 3. плохие условия быта и производства 4. вредные привычки	ОПК-5
59.	Совокупность симптомов, требующих оказания первой помощи, неотложной медицинской помощи, либо госпитализации	Неотложные (критические) состояния - это	ОПК-5

	пострадавшего или пациента в целях предотвращения и значительного и долгосрочного воздействия на физическое или психическое здоровье человека, оказавшегося в таком состоянии.		
60.	2	Оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах заключается в том чтобы: 1. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом 2. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом 3. смазать рану вазелином или кремом	ОПК-5

2. Описание шкалы оценивания

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (лабораторные работы, практические занятия), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины.

3. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент владеет достаточными знаниями по данному предмету и соответствующей теме, а также не допускает критических ошибок в своем ответе

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент владеет достаточными знаниями, но допускает незначительные ошибки по данному предмету и соответствующей теме

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент при ответе владеет неполным объемом знаний и допускает значительные ошибки

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент плохо знает или не знает нужный материал, не владеет нужными знаниями

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент выполняет все необходимые требования преподавателя и владеет необходимыми знаниями по данной дисциплине

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не выполнял работу и не владеет необходимыми знаниями по данной дисциплине

** в соответствии с результатами освоения дисциплины и видами заданий*